-Gdrant: André Sinonin

Imprimerie de la Station "Centre". Le Din

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "CENTRE"

(CHER, EURE-ET-LOIR, INDRE, INDRE-ET-LOIRE, LOIR-ET-CHER, LOIRET)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

93, rue de Curambourg - B.P. 210 - 45403 FLEURY-LES-AUBRAIS CEDEX

Téléphone: 86-36-24

Commission Paritaire de Presse nº 530 AD

ABONNEMENT ANNUEL: 70 F

M. le Régisseur de recettes de la

D.D.A. du Loiret

93, rue de Curambourg - B.P. 210 45403 FLEURY-LES-AUBRAIS CEDEX

EDITION GRANDES CULTURES

Bulletin technique nº 4

5 MARS 1982

CHARANCON DE LA TIGE

/ COLZA /

Depuis les vols enregistrés à la fin de la première décade de février, dans les postes d'ETRECHY (18), RIANS (18), LURAIS (36) et d'ISSOUDUN (36), les conditions climatiques ont été peu favorables à l'activité des charançons de la tige mais <u>une légère</u> reprise d'activité vient d'être notée <u>en Champagne Berrichonne</u>.

Toutes les cultures sont actuellement au stade sensible et une inspection régulière des pièges est nécessaire. Rappelons qu'une intervention semble justifiée dès qu'au moins 40 à 50 charançons sont capturés pendant une semaine.

L'examen de plusieurs dizaines de tiges par parcelle est également nécessaire pour s'assurer que les premières piqures de pontes n'ont pas été réalisées.

La liste des insecticides utilisables pour lutter contre ce ravageur est donnée dans le tableau de la page suivante.

MELIGETHES

Quelques méligèthes viennent d'être piégés en Champagne Berrichonne.

Dans toutes les régions les cultures précoces ont atteint le stade sensible (D1 ou l'boutons accolés encore cachés par les feuilles terminales") et une surveillance est nécessaire.

Si les premières captures en piège jaune annoncent l'arrivée des insectes dans la culture, seul un examen périodique et attentif d'une cinquantaine de plantes permet de s'assurer que le seuil d'intervention n'est pas atteint.

Un traitement est nécessaire dès que l'on dénombre en moyenne un méligèthe par inflorescence.

Par températures fraîches, il est préférable d'utiliser pour lutter contre cette espèce des insecticides à base de LINDANE, de PARATHION, de METHIDATHION ou de DELTAMETHRINE.

SALON DE L'AGRICULTURE

Le Service de la Protection des Végétaux sera présent au SALON DE L'AGRICULTURE qui se tiendra à Paris, Porte de Versailles, du 07 au 14 Mars 1982

Section MINISTERE DE L'AGRICULTURE, - Bât. 2.2, Allée K Stand Direction de la Qualité n° 332

Une prospective sur les Avertissements Agricoles sera présentée :

- Les nouveaux moyens de diffusion de l'information phytosanitaire (systèmes ANTIOPE, TELETEI
- Les outils informatiques du Service de la Protection des Végétaux (modèles de simulation . . .)

VOUS ETES CORDIALEMENT INVITE A NOUS RENDRE VISITE

HOMOLOGUEES OU EN AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE UTILISABLES DANS LA LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS DU COLZA LISTE DES MATIERES ACTIVES ENTRANT DANS LA COMPOSITION DE SPECIALITES PHYTOPHARMACEUTIQUES jour au ler Janvier 1982) M (Mise

	INSECTICIDES	691.	ea so	RA	RAVAGEURS	193 194 193	US DET
MATIERES ** ACTIVES	Spécialités Commèrciales	Mode d'Application	Petite altise	Grosse altise (A) Méligèthes (M)	Charangon des tiges	Charançon des siliques	Puceron
BROMOPHOS METHYL **	Rhodianex, Nexion EC 40 Sovinexion 25	Pulvérisation		500 (M)		500	500
CYPERMETHRINE	ipcord 5	Pulvérisation		25 (A) - 20 (M)	38	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
DELTAMETHRINE	6018	ulverisatio	18 () () ()	7,5 (A) - 5 (N)		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
DIALIPHOS *	orak			(W) 009		009	*
	groph	ulverisatio	150	5	400	009	
ENDOSULFAN	Thiodan 35 CE TechniUfan	oudrage	0	0	0 1	800	
LINDANE	Nombreuses	Pulverisation	120	200 (A.H) 275 (A.H)	300	500	1
	מברי פיזי כם		1	1			
MALATHION	Nombreuses Spécialités	Poudrage	700	700 (A.M)			
METHIDATHION	Ultracide 20	Pulverisation	130	250 (A.M)	300	500	
	ombreu	Pulverisation	200	200 (A.M)	300	500	
PARAIHION	Spécialités	oudrage	00	(A .	400	0 1	
PHOSALONE **	Azofène, Zolone	Pulvérisation		1000 (A.M)	1200	1200	
FENVALERATE	Sumicidin 10	Pulvérisation		500 (A) 400 (M)			
ASSOCIATIONS HUILE BLANCHE DE PETROLE + LINDANE + PARATHION ETHYL	Thypholine Gamma, Sopragam	Pulvérisation	enue ek sup ho eksil 5.1 eksil so wa	(A.M)			
FRDOSHIFAN+THIOMETON**	-	1 -		8 17 2			+
ENDOSULFAN+DIALIPHOS**	Fen	ulverisatio		235 241 241	nors nors	A31	

LES MATIERES ACTIVES ENTRANT DANS LA COMPOSITION DE SPECIALITES RECONNUES "NON DANGEREUSES POUR LES ABEILLES" ET DONC UTILISABLES APRÈS L'APPARITION DES PREMIERES FLEURS, DES CE STADE, L'EMPLOI DES AUTRES INSECTICIDES EST INTERDIT. DOSES EXPRIMEES EN GRAMMES DE NATIERE ACTIVE PAR HECTARE LEGENDE